PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA C.C.P. Montpellier 5238-57

Bulletin nº 7 du 29 Mai 1985

AVERTISSEMENT DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes) (les GVA, les CIVAM et les Coopératives)

* CEREALES: La ROUILLE BRUNE est présente partout, les cultures qui ont déjà reçu une protection et qui sont en cours de floraison, doivent être surveillées si le traitement a 15 jours ou plus, il est souhaitable de le renouveler.

Pour les <u>situations plus tardives</u>, la <u>Rouille Brune</u> est <u>présente sur</u> la <u>F3</u> sur des cultures en tout début d'épiaison ou en cours d'épiaison, observez vos cultures et si vous détectez la maladie, <u>Traitez impérativement</u>.

Les blés en cours de floraison, et qui n'ont pas encore reçu de protection fongicide, doivent être traités impérativement à réception de ce bulletin s'ils sont atteints de Rouille Brune, les conditions climatiques actuelles sont favorables au blé, il est indispensable de protéger la végétation afin qu'elle soit fonctionnelle le plus longtemps possible.

* CULTURES EPIEES : Utilisez une des solutions suivantes :

. IMPACT T 2,7 litres/Ha

. BAYFIDAN D 4 litres + 0.5 1/Ha

. TILT SP 2 litres/Ha

* AVANT EPIAISON : . IMPACT R 1.3 litre/Ha

. CORVET CM 4 Kgs/Ha

. TILT C 1 litre/Ha

. BAYFIDAN D 4 litres + 0,5 1/Ha (emballage associatif).

<u>Pucerons des épis</u>: Observables dans les situations les plus précoces, le seui d'intervention est un épi sur deux, colonisé par un puceron, en cas de nécessité, Traitez à l'aide de PIRIMOR G à raison de 0,250 Kgs/Ha, que vous pouvez mélanger au fongicide.

* POIS PROTEAGINEUX : Le Mildiou régresse.

Pucerons : Les parcelles non encore protégées doivent l'être à réception du présent avis. PIRIMOR G à raison de 0,5 Kgs/Ha.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42 (Tirage du 29 mai 1985 - 1 600 ex)

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles MONTPELLIER 1985)

